

Tegretol® (carbamazepine)

Waarom werd deze medicatie voorgeschreven

- De medicatie wordt gebruikt om bepaalde types van chronische pijn te behandelen
- Ze wordt voornamelijk ingezet bij aangezichtszenewpijn
- Tegretol® behoort tot de groep geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie
- Het is mogelijk dat in de bijsluiter geen melding wordt gemaakt van het effect van deze medicatie op pijn

Hoe werkt Tegretol®

- Deze medicatie verandert de manier waarop zenuwen boodschappen doorsturen naar de hersenen. Als het aantal boodschappen dat wordt doorgestuurd vermindert, dan vermindert de pijn ook

Wanneer wordt Tegretol® ingenomen

- De startdosis is laag en de medicatie mag 1 tot 4 keer per dag ingenomen worden. De dosis zal geleidelijk opgebouwd worden
- Je zal een schema meekrijgen met de startdosis en uitleg over het opbouwen van de medicatie

Hoe wordt Tegretol® ingenomen

- De tablet dient volledig ingenomen te worden (niet in 2 breken) met een glas water
- De medicatie wordt best tijdens of na de maaltijd ingenomen
- Neem niet meer van de medicatie in dan voorgeschreven

Hoe lang duurt het voor je effect mag verwachten

- Elke patiënt is verschillend
- Het kan zijn dat je het eerste effect ervaart na enkele dagen, maar het kan tot 2 maand duren alvorens je het volledige effect van de medicatie kan evalueren
- Deze medicatie werkt niet voor iedereen. Indien je geen verbetering ervaart na 6 tot 8 weken, stop dan niet onmiddellijk met de inname maar praat erover met je arts

Welke zijn de mogelijke nevenwerkingen

- Vaak voorkomende bijwerkingen: duizeligheid en vermoeidheid, braken en coördinatieproblemen. Deze bijwerkingen treden voornamelijk op bij het begin van de behandeling
- Andere vaak voorkomende nevenwerkingen zijn slaperigheid en misselijkheid
- Soms komen hoofdpijn (vooral aan het begin van de behandeling), wazig zien, dubbelzien en droge mond voor
- Zeldzame nevenwerkingen: spiersamentrekkingen, trillen en diarree of constipatie

- Zeer zeldzame nevenwerkingen zijn een verhoogde gevoeligheid voor zonlicht, zweten, haaruitval, verlies van eetlust, seksuele stoornissen, spierpijn of krampen. Verder ziet men zelden trage en onduidelijke spraak, spierzwakte, beenmergonderdrukking, nekkramp, verwarring en opwinding, depressie, rusteloosheid, hallucinaties, ongecontroleerde bewegingen, oorsuizen, tintelingen in handen en voeten, vaak moeten plassen, stoornissen in de zoutbalans, moeilijkheden met ademen
- Uiterst zeldzame nevenwerkingen: zeer trage of onregelmatige hartslag, geelzucht. Mogelijk levensbedreigende huiduitslag: Stevens-Johnson syndroom

Kan je deze medicatie langdurig innemen

- Ja, indien je er baat bij hebt. Als je de dosis van de medicatie wil verminderen, doe dit dan steeds in overleg met je arts

Mag je alcohol drinken

- De combinatie alcohol en Tegretol® is riskant. Beide middelen worden door de lever afgebroken en belasten dus allebei de lever. Daarnaast kunnen carbamazepine en alcohol elkaars effecten versterken. Het is daarom sterk aan te raden de mate van alcoholgebruik met je arts te overleggen

Mag je de wagen besturen

- Aangezien Tegretol® sufheid, slaperigheid, duizeligheid en onscherp zien kan veroorzaken is het noodzakelijk, vooral in het begin van de behandeling, extra voorzichtig te zijn bij het autorijden en het bedienen van machines. Zo deze nevenwerkingen bij je te uitgesproken zijn mag je niet autorijden of geen machine bedienen.

Belangrijke informatie voor de arts

- Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?
- Welke andere geneesmiddelen of kruiden neem je?
 - Bijvoorbeeld bloedverdunners
- Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Indien je op de korte termijn aan gezinsuitbreiding denkt, meld dit dan aan je arts
- Neem je de pil? De werking ervan kan verminderen
- Heb je nierproblemen?
- Indien je een alcohol- en/of drugsprobleem hebt/had of verslaafd was/bent aan bepaalde medicatie, meld dit dan aan je arts

Wat als je een dosis vergeet in te nemen

- Neem zo snel mogelijk de dosis in
- Indien het bijna tijd is voor de volgende inname, sla dan de vergeten dosis over en neem je medicatie verder zoals voorgeschreven
- Neem nooit twee dosissen tegelijk in

Wat als je de inname wil stoppen

- Stop niet plots met het innemen van de medicatie. Dit kan een opstoot van symptomen veroorzaken. Praat erover met je arts zodat hij je kan begeleiden bij het afbouwen van de medicatie

Deze informatie heeft niet de intentie het advies van de arts te vervangen. We raden je aan om de bijsluiter te raadplegen. Hou alle medicatie uit de buurt van kinderen, kwetsbare volwassenen en huisdieren.