

Mijn dosis:
 tablet(ten) van mg per dag en
 uur tussen elke inname laten.



Eusaprim®: co-trimoxazole (sulfamethoxazol/trimethoprim)

Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?



Co-trimoxazole is een **antibioticum** dat uit **twee** stoffen bestaat. De combinatie van deze twee antibiotica is efficiënter en werkt in op meer soorten bacteriën dan elk van beide stoffen afzonderlijk. Artsen schrijven co-trimoxazole voor bij infecties met bacteriën die gevoelig zijn aan dit antibioticum, en onder andere bij huidinfecties en **infecties van een ingeplante prothese**. Het grote voordeel van dit middel is dat het via de **mond** ingenomen kan worden, waardoor je geen infuus nodig hebt en dus ook niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. Het is van belang dat je **de hele kuur afmaakt**, ook als de infectie genezen lijkt te zijn. Er kunnen immers nog bacteriën achterblijven en die voel je niet.

Hoe neem je dit geneesmiddel in?



De **dosis** van het geneesmiddel hangt af van **jouw individuele behandeling**, nierfunctie en soort infectie. Bij een normale nierfunctie kan er bijvoorbeeld 3 keer per dag 1 tablet ingenomen worden. Je arts-specialist zal beslissen **hoelang** je dit geneesmiddel dient in te nemen, gezien dat afhangt van het soort infectie dat je hebt. Het kan zijn dat je co-trimoxazole slechts **een maand** dient te nemen, maar het kan ook langer dan 6 weken duren.

Je neemt dit geneesmiddel best in met een half glas water **tijdens of na de maaltijd**. Zo worden **nevenwerkingen** aan de maag of misselijkheid vermeden. Kies voor de inname van je geneesmiddel dagelijks **vaste tijdstippen**, dan vergeet je minder vaak een dosis.

De gebruikelijke dosering is 3 keer per dag 1 tablet, in te nemen via de mond. Er dient dan **6u tussen 2 innames** te zitten (vb. om 8u, 14u en 20u). Het kan ook zijn dat je dit geneesmiddel 1 of 2 keer per dag dient te nemen. Volg hierin steeds het advies van je **arts(-specialist) of apotheker**.

Een voorbeeld kan zijn: 3 innames van co-trimoxazole (800/160mg) per dag (8u, 14u, 20u), telkens na de maaltijd.



Wat indien je een dosis bent vergeten?



Als je dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan **4 uur** voor je de volgende dosis normaal inneemt? Neem dan de vergeten dosis alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over. De vergeten dosis neem je aan het eind van de kuur in.

Advies bij behandeling: (vb. bloedafname, extra geneesmiddelen bij gebruik...)



Om mogelijke nevenwerkingen goed te kunnen opvolgen, zal periodiek een **bloedafname** gebeuren door je huisarts. Hierin worden alle belangrijke parameters nagekeken. Zo weten we zeker dat jouw behandeling goed verloopt.

Bij langdurig gebruik en tekort in laboresultaat kan worden aangeraden om 1 keer per dag **foliumzuur** 0,4 mg in te nemen.

Meld aan je huisarts of apotheker:

- hoeveel eenheden **alcohol** je per dag drinkt
- indien je **allergisch** bent voor dit geneesmiddel of meer specifiek voor **sulfonamiden** (bepaalde antibiotica), **plasmiddelen** (diuretica) of bepaalde medicijnen tegen **diabetes**

Disclaimer

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat (1)deze fiche geen garantie biedt, noch alle informatie bevat uit de bijsluiter en beperkt is tot de mogelijke relevante informatie van belang voor je specifieke aandoening. (2)Indien vereist, het jouw (eind)verantwoordelijkheid is om de bijsluiter te raadplegen voor meer informatie. (3)Het gebruik van deze fiche op eigen verantwoordelijkheid is. (4)Je steeds de concrete omstandigheden in acht dient te nemen waarvan je kennis hebt of neemt. (5)Je zelf aansprakelijk bent voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze fiche, ongeacht of je op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid tot dergelijke schade. (6)De auteur van deze fiche in geen geval aansprakelijk is voor: (niet beperkt tot) ontbrekende informatie, (in)directe schade, verkeerde interpretatie van de informatie met gevolgen voor de individuele gezondheid.

Interacties



Er zijn **interacties** mogelijk tussen co-trimoxazole en **andere geneesmiddelen**. Meld al jouw geneesmiddelen aan je arts-specialist bij het opstarten van de behandeling, ook als je voedingssupplementen of kruiden inneemt. Er zijn een aantal geneesmiddelen die best niet gecombineerd worden met dit antibioticum. Soms kan het volstaan om de dosis of het innametijdstip van het geneesmiddel te veranderen.

Bestaande interacties werden reeds met je arts-specialist besproken. Bij opstart nieuwe medicatie gelieve opnieuw na te vragen bij je huisarts of apotheker.

Welke bijwerkingen verdienen extra aandacht?



Elk geneesmiddel heeft mogelijke bijwerkingen. Indien je veel last krijgt van nevenwerkingen, neem dan contact op met je arts. Onderstaande nevenwerkingen zijn **mogelijk**, maar het kan ook zijn dat je hier helemaal **geen last** van ondervindt.

Vaak:

- Je kan last krijgen van misselijkheid, verminderde eetlust en diarree.
- Het zou kunnen dat je last krijgt van hoofdpijn of duizeligheid.
- Het is mogelijk dat je last krijgt van huidreacties (rash, rode bultjes).
- Ook kan je een schimmelinfectie in de mond of in de vagina krijgen. Dat merk je aan een wit of grijs beslag op de tong of slijmvliezen.

Zeldzaam:

- Soms kan je last krijgen van braken.

Weetjes



- Drink voldoende **vocht** (2 liter per dag). Dan heb je minder kans op nierstenen met dit geneesmiddel.
- Co-trimoxazole zorgt ervoor dat je gevoeliger wordt aan **UV-licht**. Vermijd zon- en zonnebanken en zorg ervoor dat je ingesmeerd bent met een hoge beschermingsfactor indien je toch in de zon komt.
- Je kan een **metaalsmaak** krijgen in de mond van dit geneesmiddel, dit is van voorbijgaande aard.
- Het is mogelijk dat dit geneesmiddel je **tanden** tijdelijk **verkleurt**. Dit is goed weg te poetsen of kan bij de tandarts weggepolijst worden indien nodig.
- Indien je een **diabetespatiënt** bent, hou dan je suiker iets nauwgezetter in de gaten. Het kan zijn dat je wat sneller een lage suikerwaarde hebt en dus sneller een hypoglycemie krijgt (te lage suikerwaarde). Wanneer je dit voelt aankomen (zweten, hoofdpijn, beven, misselijkheid, honger...), eet dan zo snel mogelijk iets met snelle suikers in (cola, druivensuiker...) gevolgd door iets met trage suikers (volkoren brood, granenkoek...).

Bij vragen:

Contacteer je behandelend arts, huisarts, huisapotheker, ziekenhuisapotheker.

Doc. 62277 – maart 2023

Disclaimer

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat (1)deze fiche geen garantie biedt, noch alle informatie bevat uit de bijsluiter en beperkt is tot de mogelijke relevante informatie van belang voor je specifieke aandoening. (2)Indien vereist, het jouw (eind)verantwoordelijkheid is om de bijsluiter te raadplegen voor meer informatie. (3)Het gebruik van deze fiche op eigen verantwoordelijkheid is. (4)Je steeds de concrete omstandigheden in acht dient te nemen waarvan je kennis hebt of neemt. (5)Je zelf aansprakelijk bent voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze fiche, ongeacht of je op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid tot dergelijke schade. (6)De auteur van deze fiche in geen geval aansprakelijk is voor: (niet beperkt tot) ontbrekende informatie, (in)directe schade, verkeerde interpretatie van de informatie met gevolgen voor de individuele gezondheid.