

**Mijn dosis:**

..... tablet(ten) van .....mg per dag en  
..... uur tussen elke inname laten.



## Rifampicine

### Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?



Rifampicine is een **antibioticum** dat de groei van bacteriën remt. Het wordt opgestart in het ziekenhuis voor de behandeling van onder andere **infecties van prothesen**. Het grote voordeel van dit middel is dat het via de **mond** ingenomen kan worden, waardoor je geen infuus nodig hebt en dus ook niet in het ziekenhuis hoeft te blijven. Het is van belang dat je de **hele kuur afmaakt**, ook als de infectie genezen lijkt te zijn. Er kunnen immers nog bacteriën achterblijven en die voel je niet.

### Hoe neem je dit geneesmiddel in?



De meest gebruikte dosering is 3 x 300 mg per dag, in te nemen via de mond (ook 2 x 300 mg per dag is mogelijk en afhankelijk van je leeftijd). Je arts zal beslissen **hoelang** je dit geneesmiddel dient in te nemen, gezien dat afhangt van het soort infectie dat je hebt. De duur van de kuur is vaak **6-12 weken**, afhankelijk van het soort infectie. Volg hiervoor steeds het advies van je arts-specialist op.

Je neemt dit geneesmiddel best in op een **lege maag**. Dit kan 30 minuten vóór de maaltijd of 2 uur na de maaltijd. Slik de tablet in zijn geheel in met een groot glas water. Kies voor de inname van je geneesmiddel dagelijks **vaste tijdstippen**, dan vergeet je minder vaak een dosis.

De gebruikelijke dosering is 3 keer per dag 1 tablet. Er dient dan **6u tussen 2 innames** te zitten (vb. om 8u, 14u en 20u). Het kan ook zijn dat je dit geneesmiddel 2 keer per dag dient te nemen. Volg hierin steeds het advies van je **arts(-specialist) of apotheker**.

Een voorbeeld, indien je dit geneesmiddel 3 keer per dag dient te nemen:



### Wat indien je een dosis bent vergeten?



Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in. Duurt het **minder dan 4 uur** voor je de volgende dosis moet innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat het normale schema. De vergeten dosis neem je dan aan het eind van de kuur in. Je verschuift dus het moment waarop je de kuur beëindigt. Neem nooit een dubbele dosis!

### Advies bij behandeling: (vb. bloedafname, extra geneesmiddelen bij gebruik....)



Om mogelijke nevenwerkingen goed te kunnen opvolgen, zal periodiek een **bloedafname** gebeuren door je huisarts. Hierin worden alle belangrijke parameters nagekeken. Zo weten we zeker dat jouw behandeling goed verloopt.

Meld aan je arts(-specialist) als je nu of in het verleden problemen hebt gehad met je lever (hepatitis, levercirrose, verminderde leverwerking...).



### Interacties

Er zijn **interacties** mogelijk tussen rifampicine en **andere geneesmiddelen**. Meld **al jouw geneesmiddelen** aan je arts-specialist bij het opstarten van de behandeling met rifampicine, ook als je voedingssupplementen of kruiden

### Disclaimer

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat (1)deze fiche geen garantie biedt, noch alle informatie bevat uit de bijsluiters en beperkt is tot de mogelijke relevante informatie van belang voor je specifieke aandoening. (2)Indien vereist, het jouw (eind)verantwoordelijkheid is om de bijsluiters te raadplegen voor meer informatie. (3)Het gebruik van deze fiche op eigen verantwoordelijkheid is. (4)Je steeds de concrete omstandigheden in acht dient te nemen waarvan je kennis hebt of neemt. (5)Je zelf aansprakelijk bent voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze fiche, ongeacht of je op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid tot dergelijke schade. (6)De auteur van deze fiche in geen geval aansprakelijk is voor: (niet beperkt tot) ontbrekende informatie, (in)directe schade, verkeerde interpretatie van de informatie met gevolgen voor de individuele gezondheid.

inneemt. Er zijn een aantal geneesmiddelen die best niet gecombineerd worden met dit antibioticum. Soms kan het volstaan om de dosis of het innametijdstip van het geneesmiddel te veranderen.

Bestaande interacties werden reeds met je arts-specialist besproken. Bij opstart nieuwe medicatie gelieve opnieuw na te vragen bij je huisarts of apotheker.

### Welke bijwerkingen verdienen extra aandacht?



Elk geneesmiddel heeft mogelijke bijwerkingen. Indien je veel last krijgt van nevenwerkingen, neem dan contact op met je huisarts. Onderstaande nevenwerkingen **zijn mogelijk**, maar het kan ook zijn dat je hier helemaal **geen last** van ondervindt.

#### Vaak voorkomend:

- Je kan last krijgen van misselijkheid, buikpijn.
- Huidreacties zijn mogelijk, zo ook vermoeidheid, slaperigheid en hoofdpijn.
- Er kunnen bijwerkingen op de lever mogelijk zijn. Indien je plots een geelverkleuring van huid en ogen opmerkt met eventueel jeuk en buikpijn hierbij, contacteer dan je arts. Het zou kunnen dat je je moeilijker kan focussen of duizelig bent. Let dan op bij het autorijden of besturen van machines.

#### Zeldzaam:

- Je kan last krijgen van diarree.

### Weetjes



- Rifampicine kan een verkleuring (geel, oranje, rood, bruin) van de tanden, urine, fluïmen en tranen veroorzaken. Dit is een onschuldig verschijnsel van voorbijgaande aard. Zachte contactlenzen kunnen wel blijvend verkleuren hierdoor. Als je dit wil vermijden, draag je beter tijdelijk een bril.
- Ben je zwanger of denk je zwanger te zijn? Meld dit dan aan je arts. Rifampicine mag immers niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
- Geef je borstvoeding? Vraag dan raad aan je arts of apotheker. Rifampicine komt slechts in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht, maar er kan doorgaans veilig borstvoeding worden gegeven. De moedermelk kan door de rifampicine wel geel, oranje, rood of bruin verkleuren.
- Alcohol versterkt de bijwerkingen maagpijn, slaperigheid en leverafwijkingen. Als je last hebt van deze bijwerkingen kan je beter geen alcohol gebruiken tijdens de behandeling.

Bij vragen:

Contacteer je behandelend arts, huisarts, huisapotheker, ziekenhuisapotheker.

Doc. 62278 – maart 2023

#### Disclaimer

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat (1)deze fiche geen garantie biedt, noch alle informatie bevat uit de bijsluiter en beperkt is tot de mogelijke relevante informatie van belang voor je specifieke aandoening. (2)Indien vereist, het jouw (eind)verantwoordelijkheid is om de bijsluiter te raadplegen voor meer informatie. (3)Het gebruik van deze fiche op eigen verantwoordelijkheid is. (4)Je steeds de concrete omstandigheden in acht dient te nemen waarvan je kennis hebt of neemt. (5)Je zelf aansprakelijk bent voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze fiche, ongeacht of je op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid tot dergelijke schade. (6)De auteur van deze fiche in geen geval aansprakelijk is voor: (niet beperkt tot) ontbrekende informatie, (in)directe schade, verkeerde interpretatie van de informatie met gevolgen voor de individuele gezondheid.