




Indicatie 1: Voorkamerfibrillatie (VKF)

Indicatie 2: Preventie/behandeling diep veneuze trombose of longembolen

Opmerking: preventie na THP/TKP: Asaflow® 80 mg 2x/dag 28 dagen

afkortingen

BMS: bare-metal stent
CABG: coronaire bypass
DAPT: duale antiplaatjes therapie
DES: drug eluting stent
DOAC: Directe Orale Anticoagulantia
iCVA: ischemisch cerebrovasculair accident
LMWH: low molecular weight heparins
m: maand
MI: myocard infarct
PCI: percutane coronaire interventie
TIA: transient ischemic attack
THP/TKP: totale heup/knie prothese
VKA: Vitamine K antagonisten
VKF: voorkamerfibrillatie

Indicatie CARDIO: Secundaire preventie **coronair arterieel vaatlijden (CAD):**

1) DAPT: meestal Asaflow® + Efient of Brilique, alternatief Asaflow® + Clopidogrel
- **stabiel coronair lijden + PCI (+BMS/DES stent): 6m DAPT** (high bleeding risk: 3m)
Ter info: stabiel coronair lijden conservatieve behandeling of + CABG (bypass): Asaflow® of clopidogrel monotherapie
- **ACS (acuut MI) + PCI (+BMS/DES) of CABG of conservatieve behandeling:**
12m DAPT (high bleeding risk: 6m)

2) Na DAPT: in **alle indicaties: levenslang monotherapie Asaflow®**
(alternatief Clopidogrel) of Asaflow® + Xarelto® 2,5 mg 2x/dag indien voldaan aan terugbetalingscriteria)

Indicatie NEURO: Secundaire preventie **iCVA/TIA (hoog risico):**

21 d DAPT, daarna **levenslang monotherapie Clopidogrel** (alternatief: Asaflow®)

Uitz.1: VKF: behandeling met orale anticoagulantia

Uitz. 2: CVA onder clopidogrel: resistentietest: indien geen resistentie: DAPT ad vitam

Indicatie VASCULAIRE HEELKUNDE: Secundaire preventie symptomatisch **perifeer arterieel vaatlijden (PAV):**

1) **levenslang monotherapie Asaflow®**

NOOT: + Xarelto® 2,5 mg 2x/dag indien voldaan aan terugbetalingscriteria

2) **postchirurgisch** met drug eluting stent of ballon: **1m tot 3 m DAPT**, daarna verder volgens punt 1)

NOOT: indien VKF (DOAC/VKA): 1m tot 3 m + Asaflow®, daarna terug zoals voorheen

Triple therapie