Antidiabetica en gewichtsreducerende medicatie bij sedatie

Adviezen voor de inname en toediening vóór een onderzoek of ingreep onder sedatie

Gebruik de juiste richtlijn:

1) Onderzoek of ingreep onder sedatie: raadpleeg onderstaande lijst voor antidiabetica en gewichtsreducerende medicatie.

2) Onderzoek of ingreep onder algemene anesthesie: raadpleeg de afzonderlijke preoperatieve medicatierichtlijn via het procedureboek of de website preoperatief.

3) Bloedverdunners (anticoagulantia en antiaggregantia): raadpleeg de E17 bridging link bloedverdunners

**Indien slikproblemen, mag medicatie ook met bv. Gloup® (zero) slikgel ingenomen worden.*

De geneesmiddelen staan alfabetisch gerangschikt. Gebruik Ctrl+F om een geneesmiddel op te zoeken.

naam GM	klasse	Laatste inname/toediening
Abasaglar	langwerkende insuline analogen	avond voor onderzoek/ingreep indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden
Actrapid (= uit de handel: september 2025)	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Amarylle	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Apidra	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep.
Bydureon (= uit de handel: december 2024)	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor onderzoek/ingreep
Daonil	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Eucreas	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Fiasp	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Forxiga	oraal antidiabeticum	dag voor onderzoek/ingreep
	behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen	dag voor onderzoek/ingreep
	chronische nierschade bij volwassenen	dag voor onderzoek/ingreep
Galvus	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Glibenese	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
gliclazide	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
glimepiride	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Glucobay (uit de handel: februari 2023)	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Glucophage	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Glurenorm (uit de handel: februari 2025)	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep

Humalog	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Humalox mix 25	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddosis
Humalog mix 50	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddosis
Humuline 30/70	combinatiepreparaat: klassieke insulines	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddosis
Humuline NPH	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor onderzoek/ingreep Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden
Humuline regular	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Insulatard (= uit de handel: september 2025)	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor onderzoek/ingreep Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden
insulinepomp subcutaan (SC)	bevat Apidra, Fiasp, Humalog of Novorapid	nuchter: geen maaltijdbolus. Insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme. Eventueel correctiebolus. *Indien nuchter na ontbijt* : gewone bolus bij ontbijt en insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme
		opmerking: voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.
Insuman basal (uit de handel: januari 2023)	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor onderzoek/ingreep Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden
Insuman rapid (uit de handel: januari 2023)	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Invokana	oraal antidiabeticum	dag voor de onderzoek/ingreep
Janumet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Januvia	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Jardiance	oraal antidiabeticum	dag voor onderzoek/ingreep
	behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen	avond voor onderzoek/ingreep
Jentadueto	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Komboglyze (uit de handel: juli 2022)	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Lantus	langwerkende insuline analogen	avond voor onderzoek/ingreep Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden

Levemir	langwerkende insuline analogen	avond voor onderzoek/ingreep Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden
Lyumjev	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Metformax	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Metformine	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Minidiab	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Mounjaro	diabetes/gewichtsbeheersing	meer dan 6 dagen voor onderzoek/ingreep
Mysimba	obesitas	3 dagen voor de onderzoek/ingreep
Novomix 30	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddosis
Novomix 50	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddosis
Novomix 70 (= uit de handel, januari 2022)	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddosis
Novonorm	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Novorapid	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van onderzoek/ingreep. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Onglyza	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Ozempic	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor onderzoek/ingreep
Rastinon (buitenlands geneesmiddel)	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Repaglinide	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Rybelsus	incretinemimeticum (oraal)	meer dan 6 dagen voor onderzoek/ingreep
Saxenda [liraglutide]	incretinemimeticum (ter behandeling van obesitas)	meer dan 6 dagen voor onderzoek/ingreep
Segluromet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Sitagliptine	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Sitagliptine + Metformine	oraal antidiabeticum	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Steglatro	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Steglujan	combinatie orale antidiabetica	avond voor onderzoek/ingreep
Suliqua (uit de handel: augustus 2021)	combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline	*Indien gepland voor 's morgens:* niet toedienen en éénmalig te vervangen in ziekenhuis door insuline Abasaglar of Lantus: zelfde aantal eenheden. *Indien gepland voor 's avonds:* mag gegeven worden.
Synjardy	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
tolbutamide (buitenlands geneesmiddel)	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep

Toujeo Solostar	langwerkende insuline analogen	avond voor onderzoek/ingreep Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden
Toujeo Doublestar	langwerkende insuline analogen	avond voor onderzoek/ingreep Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden
Trajenta	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Tresiba	langwerkende insuline analogen	avond voor onderzoek/ingreep Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor onderzoek/ingreep toegediend worden
Trulicity	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor onderzoek/ingreep
Unidiamicron / uni diamicron / uni-diamicron	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Unigliclazide	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Victoza	incretinemimeticum	meer dan 6 dagen voor onderzoek/ingreep
Vipdomet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Vipidia	oraal antidiabeticum	avond voor onderzoek/ingreep
Vokanamet (uit de handel: juni 2021)	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Wegovy	obesitas	meer dan 6 dagen voor onderzoek/ingreep
Xigduo	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor onderzoek/ingreep 's morgens
Xultophy	combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline	niet toedienen op dag van onderzoek/ingreep

De arts blijft verantwoordelijk voor de finale adviezen m.b.t. het preprocedureel medicatiebeleid antidiabetica en gewichtsreducerende medicatie van de patiënt.
Voor alle (insuline behandelde) patiënten is de behandelend endocrinoloog ter beschikking voor advies.
Voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.
versie: 14112026