

Overzicht van geneesmiddelen met specifiek preoperatieve medicatieadviezen

Meest recente versie steeds terug te vinden op: azg.site/preop_medicationadvies

1. Algemene richtlijnen



Geneesmiddelenklasse	Laatste inname
CARDIOVASCULAIR STELSEL	
ACE-inhibitoren en Angiotensine Receptor Blokkers	24 uur voor operatie
Diuretica	Dag voor operatie
Anticoagulantia en anti-aggregantia	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be . In de bridging link zijn de richtlijnen verwerkt in een handige adviserende tool specifiek voor uw patiënt.
	<i>Uitzondering: voor cataractchirurgie:</i> continueer alle anticoagulantia en anti-aggregantia
HORMONAAL STELSEL	
Antidiabetica	Zie schema's hieronder.
ZENUWSTELSEL	
MAO-inhibitoren	1) antidepressiva: - Fenelzine: > 14 dagen voor operatie - Moclobemide: avond voor operatie
	2) <i>Uitzondering:</i> antiparkinsonmiddelen: doorgeven
ANDERE	
Voedingssupplementen	1) Sint-Janskruid: > 7 dagen voor operatie
	2) Ginkgo Biloba: > 7 dagen voor operatie

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN		
ingrepen abdominale heekkunde	preparaten met (lage dosis) acetylsalicylzuur moeten niet onderbroken worden.	
cataractchirurgie	oogdruppels (inclusief glaucoomdruppels) moeten niet onderbroken worden	
	indien verschillende oogdruppels: minimum 5 minuten tussen de verschillende toedieningen	
	tamsulosine moet niet onderbroken worden: het volstaat dat de oogchirurg op de hoogte is van het gebruik van deze medicatie	

Indien slikproblemen, mag medicatie ook met bv. Gloup® (zero) slikgel ingenomen worden.

2. Alfabetische lijst van geneesmiddelen met specifieke preoperatieve medicatieadviezen.

Via de zoekfunctie of 'control-F' vindt u het geneesmiddel snel terug.

naam GM	klasse	Laatste inname/toediening	Laatste inname KP bariatrische heekkunde
Abasaglar	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
acetylsalicylic acid krka	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op <u>www.e17bridginglinkbloedverdunners.be</u>	
acetylsalicylzuur	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
Actrapid (= uit de handel: september 2025)	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Aggrenox (= uit de handel)	anti-aggregans		
Afebryl	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
Afinitor (everolimus - reumatologie!)	mTOR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Aldactazine (= uit de handel: juni 2019)	diureticum	dag voor operatie	
Aldactone	diureticum	dag voor operatie	
Alecensa	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Amarylle	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Amgevita (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Amlodipine + valsartan + hydrochloorthiazeide	calciumantagonist + sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Apidra	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Alunbrig	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Apixaban	anticoagulans	Consulteer de bridging link op <u>www.e17bridginglinkbloedverdunners.be</u>	
Apremilast	tsDMARDs	niet onderbreken	
Aprovel	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Arava (leflunomide)	csDMARDs	niet onderbreken	
Arixtra	parenteraal anticoagulans	dag voor operatie 's morgens	
Asa EG	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op <u>www.e17bridginglinkbloedverdunners.be</u>	
Asaflow	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op <u>www.e17bridginglinkbloedverdunners.be</u>	
Aspegic	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
Aspirine	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
Aspirine	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op <u>www.e17bridginglinkbloedverdunners.be</u>	
Aspirine C	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
Atacand	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Atacand plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
atenolol + chloortalidon	betablokker + diureticum	dag voor operatie	
Avtozma (tocilizumab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken	
Axitinib	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	

azathioprine (reumatologie!)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
azathioprine (transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN.	
Balversa	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Belsar	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Belsar plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Benepali (etanercept)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Benlysta (belimumab)	diverse immunomodulatoren	niet onderbreken	
Bespres	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Bio-flow	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Bimzelx (bimekizumab)	IL-17 inhibitoren	niet onderbreken	
Bipressil	betablokker + ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Braftovi (encorafenib)	BRAF-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Bosulif	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Bosutinib	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Brilique	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Brukinsa	BTK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Burinex	diureticum	dag voor operatie	
Bydureon (= uit de handel: december 2024)	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Cabometyx	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Calquence	BTK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Candesart plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
candesartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
candesartan + HCT (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
candesartan + HCTZ (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
cangrelor	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Caprelsa	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
captopril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Cardioaspirine	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Cellcept (mycofenolaat - reumatologie)	immunomodulatoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Cellcept (mycofenolaat - transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN.	
Celestone (betamethason - reumatologie!)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.	
Cibinqo (abrocitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.	
Cimzia (certolizumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Clexane	parenteraal anticoagulans	indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie	
clopidogrel	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Co-amiloride (= uit de handel: september 2019)	diureticum	dag voor operatie	
Co-aprovel	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Co-bespres (= uit de handel: oktober 2020)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
co-bisoprolol	betablokker + diureticum	dag voor operatie	
co-candesartan	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	

Co-diovane	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
co-enalapril	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Cognifit	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Cogniton	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Co-inhibace	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
co-lisinopril	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
co-losartan	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Combodart	(combinatiepreparaat: solifenacine/tamsulosine)	Niet onderbreken bij (cataract)ingrepen!	
co-olmesartan	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Coperindo	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
co-ramipril	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Coramlo	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
co-renitec	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Cosentyx (secukinumab)	IL-17 inhibitoren	niet onderbreken	
Cotellic (cobimetinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
co-valsartan	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Coveram	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
Coversyl	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Coversyl plus	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Cozaar	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Cozaar plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Dabigatran	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Daonil	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Dasatinib	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
dexamethasone	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.	
Diamox	diureticum	dag voor operatie	
Diovane	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
dipyridamole (uit de handel: december 2022)	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Excedryn Migraine en hoofdpijn	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
Edoxaban	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Efient	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Eliquis	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Emcoretic	betablokker + diureticum	dag voor operatie	
enalapril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
enalapril + lercanidipine	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
Emthexate (methotrexaat)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Enbrel (etanercept)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Entresto	sacubitril + valsartan	niet te onderbreken (indicatie: hartfalen)	
Eplerenone	diureticum	dag voor operatie	
Erelzi (etanercept)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Erlotinib	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Eucreas	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Exforge	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
Exforge HCT	sartaan + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Everolimus (reumatologie)	mTOR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Everolimus (transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN.	
Fenelzine	MAO-inhibitor	> 14 dagen voor operatie	

Fiasp	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Finlee (dabrafenib)	BRAF-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Flixabi (infliximab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Fludex	diureticum	dag voor operatie	
Focuzine	geneesmiddel met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Forxiga	oraal antidiabeticum	dag voor operatie	dag voor operatie. Postoperatief terug op te starten bij ontslag of eerder op advies endocrinoloog.
	behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen	dag voor operatie	
	chronische nierschade bij volwassenen	dag voor operatie	
Forzaten	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
Forzaten HCT	sartaan + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Fosinil	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Fraxiparine	parenteraal anticoagulans	indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie	
Fraxodi (altijd 1 keer per dag!)	parenteraal anticoagulans	dag voor operatie 's morgens	
Frusamil	diureticum	dag voor operatie	
Fruzaqla	VEGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Furosemide	diureticum	dag voor operatie	
Galvus	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Ghemaxan	parenteraal anticoagulans	indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie	
ginkgo biloba	voedingssupplement	> 7 dagen voor operatie	
Gefitinib	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Giotrif	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Glibenese	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
gliclazide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
glimepiride	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Glivec	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Glucophage	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Glurenorm (uit de handel: februari 2025)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Hukyndra (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Hulio (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Humalog	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Humalox mix 25	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.

Humalog mix 50	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Humira (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Humuline 30/70	combinatiepreparaat: klassieke insulines	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Humuline NPH	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Laatste toediening: avond voor operatie.Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Humuline regular	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
hydrocortisone (reumatologie!)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.	
hydrocortisone (Solu-Cortef) (reumatologie!)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.	
Hygroton	diureticum	dag voor operatie	
Hyperiplant	geneesmiddel met Sint-Janskruid	> 7 dagen voor operatie	
Hyrimoz (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Ibrance (palbociclib)	CKD4/6-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Iclusig	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Idacio (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Ilaris (canakinumab)	IL-1 inhibitoren	niet onderbreken	
Imatinib	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Imbruvica	BTK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Imraldi (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Imuldosa (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
Imuran (azathioprine - reumatologie)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Imuran (transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN!	
Indapamide	diureticum	dag voor operatie	
Inhibace	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Inlytia	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Innohep	parenteraal anticoagulans	dag voor operatie 's morgens	
Inrebic	diverse proteïnekinase-inhibitoren	Bij voorkeur niet te onderbreken. Altijd overleg met behandelend arts!	
Inspra	diureticum	dag voor operatie	
Insulatard (= uit de handel: september 2025)	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Laatste toediening: avond voor operatie.Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
insulinepomp subcutaan (SC)	bevat Apidra, Fiasp, Humalog of Novorapid	nuchter: geen maaltijdbolus. Insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme. Eventueel correctiebolus. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone bolus bij ontbijt en insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Op dag van operatie: indien nuchter: geen maaltijdbolus. Insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme. Eventueel correctiebolus. Indien nuchter na ontbijt: gewone bolus bij ontbijt en insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme
		opmerking: voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.	opmerking: voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.

Insuman basal (uit de handel: januari 2023)	insuline met intermediaire werkingsduur	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Laatste toediening: avond voor operatie.Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Insuman rapid (uit de handel: januari 2023)	snelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Invokana	oraal antidiabeticum	dag voor de operatie	dag voor operatie. Postoperatief terug op te starten bij ontslag of eerder op advies endocrinoloog.
irbesartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
irbesartan + HCT (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
irbesartan + hydrochloorthiazide	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Iressa	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Jakavi	diverse proteïnekinase-inhibitoren	Bij voorkeur niet te onderbreken. Altijd overleg met behandelend arts!	
Jaypirca	BTK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Janumet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Januvia	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Jardiance	oraal antidiabeticum	dag voor operatie	dag voor operatie. Postoperatief terug op te starten bij ontslag of eerder op advies endocrinoloog.
	behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen	avond voor operatie	
Jentaduet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Jyseleca (filgotinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.	
Kengrexal	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Kevzara (sarilumab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken	
Kineret (anakinra)	IL-1 inhibitoren	niet onderbreken	
Kinzalmono	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Kisplyx	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Kisqali (ribociclib)	CKD4/6-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Koselugo (selumetinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Kyntheum (brodalumab)	IL-17 inhibitoren	niet onderbreken	
Lazcluze	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Lantus	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Lasix	diureticum	dag voor operatie	
Ledertrexaat (methotrexaat)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Leflunomide	csDMARDs	niet onderbreken	
Lenvima	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Levemir	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie.Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Lipercosyl	statine + ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Lipertance	statine + ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
lisinopril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Litfulo (ritlecitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.	

Lixiana	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Lodoz	betablokker + diureticum	dag voor operatie	
Loortan	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Loortan plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Lorviqua	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
losartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
losartan plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Lynparza (olaparib)	PARP-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Lyumjev	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
Mabthera (rituximab)	monoklonale antilichamen	niet onderbreken	
Marcoumar	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Marevan	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Maxsoten	betablokker + diureticum	dag voor operatie	
Medrol (reumatologie!)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.	
Mekinist (trametinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Mektovi (binimetinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Memixx	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Memoptic	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Memovital	voedingssupplement met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Metformax	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Metformine	oraal antidiabeticum (enkel metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Methofill (methotrexaat)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Metoject methotrexaat)	csDMARDs	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Micardis	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Micardis plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Millepertuis Sint-Janskruid	geneesmiddel met Sint-Janskruid	> 7 dagen voor operatie	
Milperinol	geneesmiddel met Sint-Janskruid	> 7 dagen voor operatie	
Minidiab	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
moclobemide	MAO-inhibitor	avond voor operatie	
Mounjaro	diabetes/gewichtsbeheersing	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Mycophenolat mofetil (reumatologie!)	immunomodulatoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Mycophenolat mofetil (transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN!	
Myfenax (mycofenolaat) (reumatologie!)	immunomodulatoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Myfenax (mycofenolaat) (transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN!	
Myfortic (mycofenolzuur) (reumatologie!)	immunomodulatoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Myfortic (mycofenolzuur) (transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN!	
Mysimba	obesitas	3 dagen voor de operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Nardelzine (= uit de handel: juni 2019)	MAO-inhibitor	> 14 dagen voor operatie	

Neoral-Sandimmun (ciclosporine - reumatologie)	calcineurine-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Neoral-Sandimmun (ciclosporine - transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN!	
Nepexto (etanercept)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Nexavar	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Nilotinib	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Nobiretic	betablokker + diureticum	dag voor operatie	
Novomix 30	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Novomix 50	combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: de helft van de ochtenddos.
Novonorm	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Novorapid	ultrasnelwerkend insuline	niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Niet toedienen dag van operatie.Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis.
olmesartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
olmesartan plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
olmesartan plus HCT	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
olmesartan + amlodipine	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
olmesartan + amlodipine + HCT	sartaan + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
olmesartan + HCTZ (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Olmotec	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Olmotec plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Olumiant (Baricitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.	
Omic	alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie)	1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen!	
Omjjara	diverse proteïnekinase-inhibitoren	Bij voorkeur niet te onderbreken. Altijd overleg met behandelend arts!	
Onglyza	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Orencia (abatacept)	diverse immunomodulatoren	niet onderbreken	
Otulfi (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
Ozempic	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Pazopanib	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Pemazyre	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Peramteva	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
Perdolaan compositum	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
perindopril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
perindopril + amlodipine	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
perindopril + indapamide Sandoz	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
perindopril + amlodipine + indapamide	ACE-inhibitor + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Piqray	PI3K-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Plaquenil (hydroxychloroquine)	csDMARDs	niet onderbreken	

Plavix	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Pradaxa	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
prednisolone (reumatologie!)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.	
prednisone (reumatologie!)	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.	
Preterax	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Pyzchiva (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
Qinlock	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
quinapril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
ramipril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
ramipril + amlodipine (uit de handel: november 2024)	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
ramipril + HCTZ (hydrochloorthiazide)	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Ranomax	alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie)	1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen!	
Rastinon (buitenlands geneesmiddel)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Remicade (infliximab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Remsima (infliximab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Renitec	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Repaglinide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Retsevmo	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Rinvoq (upadacitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.	
Rivaroxaban	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Rixathon (rituximab)	monoklonale antilichamen	niet onderbreken	
Roactemra (tocilizumab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken	
Rozlytrek	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Rubraca (rucaparib)	PARP-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Rybelsus	incretinemimeticum (oraal)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Rydapt	FLT3-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Salazopyrine (sulfasalazine)	csDMARDs	niet onderbreken	
Sandimmun (ciclosporine - reumatologie)	calcineurine-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 3 à 5 dagen postoperatief indien wondgenezing dit toelaat.	
Sandimmun (ciclosporine - transplantatie)	immunosuppressiva bij transplantatie	NOOIT ONDERBREKEN!	
Saphnelo (anifrolumab)	diverse immunomodulatoren	niet onderbreken	
Saxenda [liraglutide]	incretinemimeticum (ter behandeling van obesitas)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Scemblix	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Sedergine	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
Segluromet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Sevikar	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
Sevikar HCT	sartaan + calciumantagonist + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Simponi (golimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	

sint-janskruid (=Hypericum perforatum)	voedingssupplement	> 7 dagen voor operatie	
Sintrom	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Sitagliptine	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Sitagliptine + Metformine	oraal antidiabeticum	dag voor operatie 's morgens	
Solu-medrol	Glucocorticoïden	ingreep zo mogelijk uitstellen tot afbouw naar prednisolone ≤ 10 mg/dag of equivalente dosis. Overweeg stressdosis zo nodig.	
Sorafenib	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Sotyktu (deucravacitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.	
Spexotras (trametinib)	MEK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
spironolactone	diureticum	dag voor operatie	
Sprycel	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Steglatro	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
Steglujan	combinatie orale antidiabetica	avond voor operatie	
Stelara (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
Steqeyma (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
Stivarga	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Suliqua (uit de handel: augustus 2021)	combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline	<i>Indien gepland voor 's morgens:</i> niet toedienen en éénmalig te vervangen in ziekenhuis door insuline Abasaglar of Lantus: zelfde aantal eenheden. <i>Indien gepland voor 's avonds:</i> mag gegeven worden.	
Sunitinib	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Sutent	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Sylvant (siltuximab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken	
Synjardy	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	dag voor operatie 's morgens. Pas terug op te starten bij ontslag.
Tafinlar (dabrafenib)	BRAF-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Tagrisso	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Taltz (ixekizumab)	IL-17 inhibitoren	niet onderbreken	
Talzenna (talazoparib)	PARP-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Tamsulosine	alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie)	Niet onderbreken bij (cataract)ingrepen!	
Tanakan	geneesmiddel met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Tasigna	BCR-ABL-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Tavoforce	geneesmiddel met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Tavonin	geneesmiddel met ginkgo Biloba	> 7 dagen voor operatie	
Tazko	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
telmisartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
telmisartan plus HCT (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
telmisartan + HCTZ (hydrochloorthiazide)	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
telmisartan + hydrochloorthiazide	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Tenoretic	betablokker + diureticum	dag voor operatie	
Teveten	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
Teveten plus	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Ticagrelor	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Ticlid	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	

ticlopidine	anti-aggregans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be	
Tepmetko	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Tibsovo	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
tolbutamide (buitenlands geneesmiddel)	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	
torasemide	diureticum	dag voor operatie	
Torrem	diureticum	dag voor operatie	
Toujeo <u>Solostar</u>	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens:</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Toujeo <u>Doublestar</u>	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens :</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Trajenta	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Tresiba	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens:</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden	halveer al uw insuline dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie. Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden.
Trinomia	ACE-inhibitor + statine + acetylsalicylzuur	vraag advies arts omwille van aanwezigheid acetylsalicylzuur (advies ACE-inhibitor: stop dag voor operatie 's morgens)	
Triplixam	ACE-inhibitor + calciumantagonst + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Tritace	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Tritazide	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Troc	pijnmedicatie met acetylsalicylzuur	bij voorkeur niet in te nemen vanaf 1 week voor de operatie	
Trulicity	incretinemimeticum (once weekly)	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Truqap	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Truxima (rituximab)	monoklonale antilichamen	niet onderbreken	
Tukysa	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Twynsta	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
Tyenne (tocilizumab)	IL-6 inhibitoren	niet onderbreken	
Tyverb	EGFR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Unidiamicron / uni diamicron / uni-diamicron	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Unigliclazide	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heekunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Usymro (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
Uzpruvo (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
valsartan	sartaan	dag voor operatie 's morgens	
valsartan + amlodipine	sartaan + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
valsartan + hydrochloorthiazide	sartaan + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Vanflyta	FLT3-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Vargatef	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	

Verzenios (abemaciclib)	CKD4/6-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Vesomni	benigne prostaathypertrofie (combinatiepreparaat: dutasteride/tamsulosine)	Niet onderbreken bij (cataract)ingrepen!	
Victoza	incretinemimeticum	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Vipdomet	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	
Vipidia	oraal antidiabeticum	avond voor operatie	Laatste toediening: avond voor operatie. Postoperatief: terug op te starten op advies endocrinoloog.
Vitrakvi	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Votrient	diverse proteïnekinase-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Votubia (everolimus - oncologie)	mTOR-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Wegovy	obesitas	meer dan 6 dagen voor operatie	Stop geneesmiddel bij de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Na de operatie moet dit geneesmiddel ook niet meer terug opgestart worden.
Wezenla (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
Xalkori	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Xarelto (niet meer terugbetaald sinds 1/9/2024)	anticoagulans	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be	
Xeljanz (tofacitinib)	JAK-inhibitoren	onderbreek 2 à 3 dagen voor de ingreep.	
Xigduo	oraal antidiabeticum (o.a. metformine)	dag voor operatie 's morgens	dag voor operatie 's morgens. Pas terug op te starten bij ontslag.
Xospata	FLT3-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien hemostase dit toelaat.	
Xultophy	combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline	niet toedienen op dag van operatie	halveer al uw dosissen van al uw injecties vanaf de start van uw specifiek dieet i.k.v. bariatrische heelkunde (gepland op .../.../...). Laatste inname: avond voor operatie.
Yesintek (ustekinumab)	IL-12/IL-23 inhibitoren	niet onderbreken	
Yuflyma (adalimumab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Zanicombo	ACE-inhibitor + calciumantagonist	dag voor operatie 's morgens	
Zejula (niraparib)	PARP-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Zelboraf (vemurafenib)	BRAF-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat.	
Zessly (infliximab)	TNF-remmers	niet onderbreken	
Zestoretic	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Zestril	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Zibrine (= uit de handel: juli 2019)	geneesmiddel met Sint-Janskruid	> 7 dagen voor operatie	
Zopranol	ACE-inhibitor	dag voor operatie 's morgens	
Zopranol plus	ACE-inhibitor + diureticum	dag voor operatie 's morgens	
Zykadia	ALK-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	
Zydelig	PI3K-inhibitoren	onderbreek 1 week voor de ingreep; herstart 1 week na de ingreep indien wondgenezing dit toelaat. Altijd overleg met behandelend arts!	

De arts blijft verantwoordelijk voor de finale adviezen m.b.t. het preoperatief medicatiebeleid van de patiënt.

Voor alle (insuline behandelde) patiënten is de behandelend endocrinoloog ter beschikking voor advies.

Voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.

versie: 18082026

contactpersonen: Apr. Julie Van Den Broucke (056/63 50 85), dr. Steelant (056/63 30 56) of dienst anesthesie (056/63 51 55) az groeninge